

ПИОДЕРМИЯ ХРОНИЧЕСКАЯ ЯЗВЕННО-ВЕГЕТИРУЮЩАЯ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ПИОДЕРМИЯ ХРОНИЧЕСКАЯ ЯЗВЕННО-ВЕГЕТИРУЮЩАЯ - глубокая стрептостафилодермия. Характеризуется язвенно-вегетирующими участками поражения кожи с гистологическими признаками псевдоэпителиоматозной гиперплазии и хронического гранулематоза. Возбудителями заболевания чаще являются золотистый стафилококк и стрептококки группы А. Болезнь нередко развивается у больных язвенным колитом, алкоголизмом, [лимфомой](#) и другими иммунодефицитными состояниями.

Клиника.

Поражения кожи могут представлять собой язвенные поверхности (чаще на нижних конечностях) с неровными, подрытыми краями и покрытым вегетациями дном с ссозно-гнойным отделяемым и неприятным запахом.

Кожа вокруг язвенных поверхностей воспалена, инфильтрирована.

Возможно также образование выступающих, покрытых гнойными корками и вегетациями бляшек, окруженных мелкими пустулезными высыпаниями.

Своеобразной формой хронической язвенной пиодермии является [пиодермия шанкриформная](#).

Дифференциальный диагноз проводят с:

- [вегетирующей пузырьчаткой](#),
- йододермой,
- бромодермой и др.

Лечение:

- выявление и лечение болезней, способствующих развитию хронической пиодермии.
- антибиотики широкого спектра,
- иммуномодуляторы,
- витамины,
- кортикостероиды,
- цитостатики (проспидии и др.)
- плазмаферез,
- антистафилококковая плазма,
- у-глобулин,

- стафилококковая и стрептококковая вакцины,
- гипербарическая оксигенация,
- УФ-лучи,
- УВЧ-терапия,
- гелий-неоновый лазер;

наружно:

- дезинфицирующие средства,
- 5-10% дерматол-ихтиоловая мазь,
- мази с антимикробными средствами
- эпителизирующие средства (ируксол, левомеколь, раствор «Куриозин»).