

ИМПЕТИГО ГЕРПЕТИФОРМНОЕ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ИМПЕТИГО ГЕРПЕТИФОРМНОЕ ГЕБРЫ - КАПОШИ (син. импетиго беременных) - редкий дерматоз. Болеют преимущественно беременные, иногда небеременные, а также мужчины.

Клиника

Чаще в крупных складках, на воспалительном отечном фоне появляются герпетиформно или кольцевидно расположенные мелкие пустулы, после вскрытия покрывающиеся грязными гнойно-геморрагическими, коричневатыми корками.

Зуд обычно отсутствует.

Содержимое пустул чаще стерильно.

В процесс часто вовлекаются слизистые оболочки.

В крови - гипокальциемия.

Заболевание протекает хронически, с тяжелыми обострениями, резким ухудшением общего состояния. Возможен летальный исход.

В крови - гипокальциемия.

Беременность может закончиться выкидышем или мертворождением.

Дифференциальный диагноз гепетиформного импетиго проводят с:

- акродерматитом Аллопо,
- пустулезным псориазом,
- герпесом беременных,
- герпетиформным дерматитом Дюринга
- субкорнеальным пустулезом.

Лечение гепетиформного импетиго:

- кортикостероиды,
- антибиотики широкого спектра действия,
- переливание крови,
- антисептические мази,
- фукорцин.

При тяжелом течении болезни показано прерывание беременности.

