ПСЕВДОКСАНТОМА ЭЛАСТИЧЕСКАЯ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ПСЕВДОКСАНТОМА ЭЛАСТИЧЕСКАЯ (син.: Гренблад-Страндберга синдром) - наследственное системное заболевание, обусловленное генерализованным поражением (эласторексисом) эластической ткани кожи, сосудов, базальной пластинки глаз и отложением кальция в поврежденных эластических фибриллах. Наследование заболевания определяют два аутосомно-доминантных и три аутосомно-рецессивных типа.

Изменения кожи очень характерны. Они возникают в детском возрасте или позднее, обычно до 30 лет и характеризуются множеством мелких (1-3 мм в диаметре) желтоватых папул с линеарной или сетевидной группировкой на коже боковых поверхности шеи, подмышечных ямок, пахово-бедренных складок, локтевых и подколенных сгибов. Кожа в пораженных участках становится дряблой, морщинистой, повисает складками, особенно у взрослых. Своеобразие пораженной кожи подчеркивают термином "кожа цыпленка". В ряде случаев поражение может захватить весь кожный покров.

Сходные изменения могут наблюдаться на слизистых оболочках мягкого неба, губ, желудка, прямой кишки, влагалища. Изменения глаз, сердечно-сосудистой системы обычно развиваются до 30-летнего возраста.

Дифференциальный диагноз проводят с:

- ксантоматозом,
- дерматофиброзом лентикулярным Бушке - Оллендорффа.

Изменения кожи по типу псевдоксантомы эластической могут быть вызваны пеницилламином.

Лечение направлено на предупреждение осложнений.