

Чесотка

Вельтищев Ю. Е. Комаров Ф.И. Навашин С.М.
Справочник практического врача

ЧЕСОТКА — контагиозное паразитарное заболевание человека, характеризующееся ночным зудом, расчесами, образованием на коже «чесоточных ходов».

Возбудитель чесотки — чесоточный клещ.

Заражение чесоткой происходит от больного человека при прямом контакте или через предметы, находившиеся в его употреблении (одежда, постель и др.).

Инкубационный период при чесотке — около 1-2 нед.

Клинические проявления чесотки обусловлены внедрением оплодотворенной самки клеща в роговой слой эпидермиса, где она роет чесоточные ходы, в которых откладывает яйца. Через 2 нед, пройдя несколько стадий развития, из яиц возникают зрелые формы чесоточного клеща, которые внедряются после оплодотворения в новые участки кожи.

Клиническая картина чесотки. Основным симптомом чесотки является распространенный ночной зуд, обусловленный активностью чесоточных клещей в это время суток. Помимо расчесов, имеются мелкие папуловезикулы и патогномоничные для заболевания «чесоточные ходы» в виде небольших сероватых, слегка возвышенных, прямых или изогнутых полосок с пузырьком на конце, в котором находится самка чесоточного клеща. Излюбленной локализацией являются участки с тонкой нежной кожей (межпальцевые складки кистей, подкрыльцовые впадины, лучезапястные сгибы, живот, половой член, внутренняя поверхность бедер, молочные железы).

Чесоткой не поражается кожа лица и волосистой части головы.

Чесотка нередко осложняется [пиодермией](#) ([фурункулы](#), [эктимы](#), [импетиго](#)).

Диагноз чесотки основан на типичной симптоматике, выявлении чесоточных ходов, обнаружении чесоточного клеща при лабораторном исследовании.

Лечение чесотки:

- втирание в кожу противопаразитарных средств (33 % серная мазь или мазь Вилькинсона 1 раз в день в течение 5 дней);
- обработка по методу Демьяновича (втирание 60 % раствора гипосульфата натрия, затем 6 % раствора хлористоводородной кислоты по 20 мин);
- 20 % (у детей 10 %) эмульсия бензил-бензоата втирается ватно-марлевым тампоном 2 раза по 10 мин с 10-минутным перерывом.

После применения растворов Демьяновича и эмульсии бензил-бензоата больные меняют нательное и постельное белье и в течение 3 дней воздерживаются от мытья. Через 3 дня необходимо провести общее мытье с повторной сменой нательного и постельного белья.

Вещи и жилье больного чесоткой подлежат дезинфекции.

Необходимо обследование лиц, бывших в контакте с больным чесоткой, и одновременное лечение всех заболевших.