

ДИАБЕТИДЫ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ДИАБЕТИДЫ - поражения кожи при сахарном диабете. В результате микроангиопатий на коже лица, конечностей возникает стойкая эритема, на голенях - темно-красные шелушащиеся узелки, разрешающиеся в коричневые атрофические рубчики (диабетическая дермопатия).

Диабетическая нейропатия характеризуется образованием на коже стоп перфорирующих язв, сенсорными нарушениями, нарушениями потоотделения.

Возможно развитие «диабетической стопы» (комбинация язвенно-некротических поражений, межпальцевой мацерации с присоединением пиококковой или грибковой флоры, остеомиелита).

Инсулинорезистентная форма диабета может сопровождаться развитием acanthosis nigricans.

Типичен липоидный некробиоз.

Возможно возникновение:

- кольцевидной гранулемы,
- диабетических пузырей,
- гиперпигментации кожи локтей, колен и тыла кистей;
- генерализованного зуда;
- эруптивной ксантомы;
- склеродермiformных изменений кожи,
- витилиго,
- красного плоского лишая (особенно, эрозивной формы - синдром Гриншпана-Потекаева);
- рецидивирующей пиодермии,
- микозов кожи.