

АКРОДЕРМАТИТ

атрофический хронический

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

АКРОДЕРМАТИТ АТРОФИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ (син.: атрофия кожи идиопатическая прогрессирующая Пospelова, эритромелия Пика) - проявление III стадии [Лайм-боррелиоза](#), вызываемого одним из видов спирохет - боррелиями Бургдорфера.

До выявления возбудителя атрофический хронический акродерматит рассматривали как самостоятельное заболевание кожи неизвестной этиологии.

Подтверждением боррелиозного происхождения процесса является обнаружение возбудителя в пораженной коже.

Процесс развивается обычно через 1- 8 лет с момента заражения.

Клинически процесс характеризуется появлением на коже конечностей (чаще на тыле стоп, кистей) и медленным увеличением в размерах застойно-синюшной эритемы, которая может сопровождаться неприятными ощущениями (покалыванием и др.).

Через несколько месяцев постепенно развивается атрофия кожи: кожа истончается, приобретает белесоватый цвет, легко собирается в складки, напоминает папиросную бумагу, слегка шелушится. Под ней легко различается венозный рисунок. На тыле стоп, предплечий, голеней, наряду с атрофией, могут наблюдаться очаги уплотнения кожи (псевдосклеродермия).

Для **диагностики** заболевания используют, помимо клинических и гистологических данных, непрямую РИФ с боррелиями, которая дает резко положительный результат в 100% случаев, что позволяет также дифференцировать процесс от склеродермии.

Лечение - как при [Боррелиозе](#).