# КЕРАТОЗ ВОЛОСЯНОЙ АТРОФИЧЕСКИЙ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

КЕРАТОЗ ВОЛОСЯНОЙ АТРОФИЧЕСКИЙ - группа близких по клинической картине форм фолликулярных (волосяных) кератозов, оставляющих после себя атрофию кожи.

**Кератоз волосяной атрофический лица** (эритема рубцующаяся надбровная, ulerythema ophryogenes) проявляется покраснением и шелушением кожи бровей с развитием локальной алопеции бровей, особенно в латеральных зонах.

**Атрофодермия червеобразная** (atrophodermia vermiculata; фолликулит ульэритематозный сетчатый) развивается обычно в детском возрасте и отличается поражением преимущественно кожи щек. На щеках на фоне легкой эритемы формируются фолликулярные роговые узелки, оставляющие после себя сетевидную атрофию кожи.

**Кератоз волосяной декальвирующий Сименса** наблюдается у мальчиков, проявляясь в первые месяцы жизни многочисленными высыпаниями типа милиума на коже носа и щек. Позже на разгибательных поверхностях конечностей, на шее, волосистой части головы появляются милиарные остроконечные узелки с шипиками. При развитии атрофии на лице формируется клиническая картина атрофодермии, в области бровей и волосистой части головы развивается атрофическая очаговая алопеция.

**Дифференцируют** с синдромом Лассуэра-Литтла.

**Лечение** малоэффективно, назначают:

- витамин А,
- аевит,
- ретиноиды;

местно

- кортикостероидные мази,
- кремы;
- крем «Скинорен».