ПАПИЛЛОМАТОЗ КОЖИ КАРЦИНОИДНЫЙ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ПАПИЛЛОМАТОЗ КОЖИ КАРЦИНОИДНЫЙ ГОТТРОНА - редкое предраковое заболевание.

Характеризуется псевдоэпителиоматозной гиперплазией эпидермиса в виде папилломатозных бородавчатых разрастаний и вегетации с гнойным отделяемым, развивающимся на фоне предшествовавших хронических дерматозов различной этиологии:

- экзема,
- нейродермит,
- красный плоский лишай,
- ихтиоз,
- вульгарная волчанка и др.

Процесс часто локализуется на нижних конечностях в условиях нарушения их кровоснабжения.

Возраст больных колеблется от 40 до 85 лет.

Течение длительное, с трансформацией в плоскоклеточный рак.

Дифференциальный диагноз карциноидного папилломатоза Готтрона проводят с:

- высокодифференцированным плоскоклеточным раком кожи,
- хронической вегетирующей пиодермией,
- бородавчатым туберкулезом кожи,
- хромомикозом.

Лечение:

- проспидин (на курс 2,0-2,5 г внутримышечно),
- витаминотерапия,
- антибиотики,
- теоникол (по 0,15 г 3 раза в день в течение 20-30 дней),

наружно:

- примочки с фурацилином,

- перманганатом калия,

в дальнейшем:

- криодеструкция
- или удаление очагов лучами лазера.