ПОЙКИЛОДЕРМИЯ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ПОЙКИЛОДЕРМИЯ (син. пестрая кожа) - изменения кожи, включающие сетчатую гиперпигментацию, атрофию, телеангиэктазии, мелкие участки депигментации, шелушение и нередко милиарные лихеноидные папулы, обусловливающие пестрый характер пораженного участка кожи.

Пойкилодермия может быть симптомом различных поражений кожи:

- наследственных заболеваний (Ротмунда-Томсона синдром, дискератоз врожденный и др.),
- болезней соединительной ткани,
- лимфом, особенно грибовидного микоза.

Развивается пойкилодермия в результате воздействия фотосенсибилизирующих средств, ионизирующей радиации, при некоторых формах дерматозов (например,красного плоского лишая), меланодермии и др.

ПОЙКИЛОДЕРМИЯ АТРОФИЧЕСКАЯ СОСУДИСТАЯ -хронический зудящий дерматоз с гипер- и гипопигментацией, атрофией, тонкими телеангиэктазиями, а иногда с мелкими ярко-красными папулами.

Чаще развивается у лиц среднего возраста.

Клинически характеризуется эритемой, кожа имеет вид папиросной бумаги, что симулирует радиодерматит.

Высыпания носят постоянный характер, располагаются симметрично в области грудной клетки, ягодиц, разгибательных поверхностей конечностей, редко - на слизистых оболочках.

Течение медленное, прогрессирующее.

Идиопатическая атрофическая сосудистая пойкилодермия может предшествовать проявлениям кожной или системной лимфомы.

Лечение:

- электрокоагуляция,
- дермабразия,
- углекислый лазер.