

Синдром Висслера-Фанкони

Дифференциальная диагностика

«Дифференциальная диагностика кожных болезней»

Руководство для врачей

под ред. Б.А. Беренбейна, А.А. Студницина

Синдром Висслера-Фанкони (Wissler - Fanconi syndromus; син.: аллергический субсепсис) — хроническое заболевание септико-аллергической природы, наблюдающееся у детей. Характеризуется длительной перемежающейся лихорадкой, появляющейся у детей при развитии аллергической реакции на относительно легкую бактериемию (слабовирулентные стафилококки и стрептококки), рецидивирующими высыпаниями на коже лица, груди, конечностей уртикарного характера (реже скарлатино- и кореподобных, а также по типу [узловатой](#) или [многоформной экссудативной эритемы](#)).

Возможны артралгии, артропатии ревматоидного типа со склонностью к деформации суставов, миокардит, пневмонии. В крови нейтрофилез со сдвигом влево, повышенная СОЭ, посевы крови дают отрицательный результат.

Дифференциальную диагностику с крапивницей проводят на основании следующих признаков, нехарактерных для крапивницы: длительной перемежающейся лихорадки, полиморфизма сыпи (образование, помимо преимущественно уртикарных высыпаний, элементов сыпи типа узловатой или [многоформной эритемы](#)), изменений крови в виде выраженного нейтрофилеза, повышенной СОЭ, а также наличия поражений сердца (миокардит), легких (пневмонии) и суставов (артралгии).