

ЭПИДЕРМОФИТИЯ ПАХОВАЯ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ЭПИДЕРМОФИТИЯ ПАХОВАЯ - дерматомикоз, вызываемый грибом *Epidermophyton floccosum*, поражающим эпидермис и ногти.

Заражение происходит, как правило, через предметы ухода за больными, а также через постельное белье и другие вещи больного.

Инфицированию и развитию эпидермофитии способствуют в качестве дополнительных факторов согревающие компрессы и влажные обертывания.

Контагиозность довольно высока: описаны эндемические вспышки в больницах и домах престарелых. Болеют, за редким исключением, взрослые, в основном мужчины.

Наиболее частая локализация - паховые складки. Обычно микоз выходит за пределы паховых складок, распространяясь на внутреннюю поверхность бедер, мошонку, промежность, перианальную область и межъягодичную складку, а также на межпальцевые промежутки стоп. Возможно изолированное поражение этих областей. В результате аутоинокуляции или первичного инфицирования пораженными могут оказаться подмышечные ямки, складки под молочными железами у женщин, локтевые сгибы и подколенные ямки, а также любой участок кожного покрова, включая волосистую часть головы.

Первоначальные проявления эпидермофитии представлены небольшими, слегка отечными округлыми пятнами розового цвета с гладкой поверхностью и резкими границами. В результате увеличения в размерах и слияния пятен друг с другом образуется сплошной очаг с фестончатыми контурами, склонный к периферическому росту. Краевая зона очага отчетливо выстоит над его центром и окружающей кожей, покрыта пузырьками, эрозиями, чешуйками и корочками.

Лечение и профилактика эпидермофитии - см. [Микозы стоп](#).