

# ДЕРМАТИТ ЭКСФОЛИАТИВНЫЙ РИТТЕРА

О.Л. Иванов, А.Н. Львов  
«Справочник дерматолога»

ДЕРМАТИТ ЭКСФОЛИАТИВНЫЙ РИТТЕРА - тяжелое стафилококковое заболевание ослабленных новорожденных, являющееся злокачественной формой [эпидемической пузырчатки новорожденных](#).

## Клиническая картина

Выделяют три стадии болезни:

- эритематозную,
- эксфолиативную
- регенеративную.

Начинается с возникновения эритемы с трещинами и крупнопластинчатым шелушением вокруг рта и пупка, быстро распространяющейся от верхней части туловища к нижней, с последующим образованием вялых пузырей и отторжением эпидермиса.

Положителен краевой симптом Никольского.

Общее состояние ребенка тяжелое. Возможен летальный исход вследствие развития септических осложнений. При благоприятном течении процесс переходит в регенеративную стадию.

**Дифференциальный диагноз** проводят с сифилитической пузырчаткой.

## Лечение:

- Новорожденного помещают в кувез.
- Антибиотики: пенициллиназорезистентные пенициллины, кефзол, цепорин и др.,
- антистафилококковый гамма-глобулин,
- гемодез,
- полиглюкин,
- лактобактерин,
- бифидумбактерин,
- витамины;

местно:

- анилиновые красители (водные растворы),
- присыпки с ксероформом.

