

АБСЦЕССЫ МНОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕТЕЙ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

АБСЦЕССЫ МНОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕТЕЙ (син. псевдофурункулез Фингера) - форма глубокой стафилодермии, развивающаяся у детей грудного возраста.

Клиника.

Болезнь проявляется образованием воспалительных узелков, локализующихся в подкожной клетчатке на туловище (спина, ягодицы), шее. Через 2-3 дня узелки увеличиваются, становятся плотными, болезненными, абсцедируются. Через формирующийся свищевой ход выделяется гной. На месте бывших абсцессов остаются рубцы. Процесс сопровождается лихорадкой (38-39°C), диспепсией, лейкоцитозом, увеличением СОЭ. Часты гнойные осложнения.

Дифференциальный диагноз проводят с колликативным [туберкулезом](#).

Лечение

Лечение проводят в стационаре:

антибиотики (пенициллин по 10000-20000 ЕД/кг в сутки, гентамицин, цефамезин, клафоран и др.), иммунные препараты (гамма-глобулин, антистафилококковая плазма, стафилококковый анатоксин), детоксицирующие средства (гемодез, альбумин, реополиглюкин, нативная плазма).

При дисбактериозе - эубиотики, витамины (А, В5, В6, Е).

Наружно - 2% спиртовой раствор бриллиантового зеленого, метиленового синего, пасты с антибиотиками, ксероформом, мази "Левосин", "Левомеколь" и др.

Кожу вокруг абсцессов обрабатывают спиртовыми растворами.

На абсцессы назначают УВЧ-терапию (3-5 сеансов).

Ребенка не купают.