

# **Хроническая поверхностная диффузная стрептодермия.**

Конспект лекции для студентов лечебного факультета.  
Кафедра дерматовенерологии СПбГМА

Хроническая поверхностная диффузная стрептодермия представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся диффузным поражением значительного участка кожного покрова, чаще всего - кожи голени.

## **Этиопатогенез.**

Возбудитель - стрептококк, возможно присоединение стафилококковой инфекции.

## **Предрасполагающие факторы:**

1. Длительное местное нарушение кровообращения с развитием гипоксии и нарушением обменных процессов в коже. Может иметь место при:

- Варикозном расширении вен
- Облитерирующих заболеваниях нижних конечностей
- Длительном охлаждении нижних конечностей
- Длительном пребывании на ногах и т.д.

2. «Паратравматическая стрептодермия» развивается вокруг длительно незаживающих ран и язв

## **Клинические проявления.**

Пораженный участок резко отграничен от здоровой кожи каемкой отслаивающегося рогового слоя.

Кожа в области поражения резко гиперемирована, иногда застойно-синюшная, покрыта большим количеством крупных корок коричнево-желтого или зеленоватого цвета. После удаления корок обнажается сплошная мокнущая поверхность с густым серозным или серозно-гнойным отделяемым.

Пораженный участок имеет склонность к периферическому росту. По мере стихания воспаления мокнутие и образование корок прекращается, кожа покрывается крупными чешуйками.

Течение заболевания хроническое, рецидивирующее. При длительном существовании очагов поражения возможен постепенный переход к экзематизации - появление на эритематозном фоне микроэрозий, отделяющих мельчайшие капли серозной жидкости.

### **Лечение.**

1. Устранение предрасполагающих факторов (прежде всего нарушений кровообращения)
2. Общая антибактериальная терапия (лучше с учетом чувствительности к антибиотикам).
3. Местная терапия:
  - Примочки, влажно-высыхающие повязки с противомикробными и дезинфицирующими средствами
  - Анилиновые красители
  - 5% дерматоловая паста, мазь бактробан
  - Обтирание окружающей здоровой кожи спиртовыми растворами дезинфицирующих средств (2% салициловый спирт и др.)