

ЭРИЗИПЕЛОИД

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ЭРИЗИПЕЛОИД (син.: эризипелоид Розенбаха, рожа свиная) - инфекционное заболевание кожи, вызываемое палочкой свиной рожи (*Erysipelothrix insidiosa*).

Заражение происходит при разделке мяса, птицы, рыбы, особенно при уколах и других травмах кожи.

Заболевание чаще проявляется в локализованной кожной форме, хотя возможны также генерализованная кожная и системная формы с поражением сердца, суставов, костей и др.

Инкубационный период составляет 1-2 сут. На месте повреждения кожи появляется красное пятно (чаще в области пальцев кистей), увеличивающееся до 10 см. Затем в центральной части очаг постепенно бледнеет, а периферическая зона эритемы приобретает синюшно-красный оттенок. Через 2-3 нед наступает полный регресс.

В отличие от [рожи](#) общих симптомов не отмечается; возможно вовлечение в воспалительный процесс суставов кисти.

Лечение эризипелоида:

- антибиотики (пенициллин, линкомицин, цефалоспорины),
- УФ-облучение в эритемной дозе,
- наружно - 20-30% ихтиоловая мазь.

Профилактика эризипелоида:

- Необходимо предупреждение микротравм у рабочих мясо- и рыбокомбинатов,
- обработка повреждений кожи 2-5% настойкой йода и другими дезинфицирующими средствами.