

КСАНТЕЛАЗМА, КСАНТОМАТОЗ КОЖИ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

КСАНТЕЛАЗМА - разновидность ксантоматоза. Развивается на фоне гиперлипидемии (иногда и при нормальном уровне липидов), чаще у женщин среднего и пожилого возраста, особенно страдающих заболеваниями печени.

Клинически проявляется желтыми плоскими или слегка возвышенными, четко отграниченными бляшками с гладкой или слегка морщинистой поверхностью, расположенными в области век.

КСАНТОМАТОЗ КОЖИ - поражение кожи в виде ксантом. Развивается в результате нарушения липидного обмена и характеризуется отложением липидов в сосочковом слое дермы внутриклеточ-но с образованием ксантомных (пенистых) клеток или внеклеточно.

Различают ксантоматоз первичный (наследственный) и вторичный (симптоматический).

Ксантоматоз первичный включает 5 типов гиперлипопротеидемий.

По клиническим признакам различают ксантомы

- ◆плоские,
- ◆сухожильные - с внутриклеточным типом отложения липидов,
- ◆туберозные,
- ◆эруптивные
- ◆ксантелазму - с внеклеточным типом отложения липидов и возможной воспалительной реакцией вокруг.

Лечение ксантоматоза:

- разгрузочная диета с исключением животных жиров;
- гиполипидемические препараты:
 - холестирамин,
 - клофибрат (мисклерон).
- никотиновая кислота,
- гепарин (особенно при I и V типах гиперлипопротеидемий).

Отдельные ксантомы удаляют с помощью

- диатермокоагуляции,
- криодеструкции
- хирургическим путем.

