

ЛИМФАНГИОМА

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ЛИМФАНГИОМА - доброкачественная опухоль из лимфатических сосудов. Часто выявляется у новорожденных и сочетается с различными аномалиями, в том числе с [гемангиомой](#).

Различают первичные и вторичные лимфангиомы.

Вторичные лимфангиомы являются проявлением лимфостаза после перенесенного инфекционного заболевания (рожа и др.).

Клинически при **капиллярной лимфангиоме** вначале появляется пятно, которое диффузно уплотняется, кожа над очагом не собирается в складки.

Для **кистозной лимфангиомы** характерны сгруппированные прозрачные пузырьковые элементы, располагающиеся на отечном, уплотненном основании чаще на лице, шее, в подмышечных впадинах.

Кавернозная лимфангиома встречается редко и характеризуется крупными пастозными множественными узлами на отечном плотном основании, может диффузно поражать нижние конечности, при этом увеличивается их объем.

Важным диагностическим признаком лимфангиомы является выход лимфы при механическом повреждении или прокалывании очага поражения иглой.

Дифференциальный диагноз лимфангиом проводят с:

- бляшечной склеродермией,
- [гемангиомой](#).

Лечение лимфангиом:

- первичные лимфангиомы иссекают хирургическим путем,
- при вторичных проводят лечение лимфостаза.