

ПРЕДРАК КОЖИ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

ПРЕДРАК КОЖИ - поражение кожи, которое становится инвазивной опухолью настолько часто, что ее развитие может быть статистически предсказуемым.

Предраковое состояние может возникать вслед за повреждением зоны соединения эпидермиса и дермы; развитием хронической гранулемы и повреждений, оставляющих рубцы; после ряда хронических дерматозов, таких как:

- дискоидная красная волчанка,
- красный плоский лишай слизистых оболочек,
- дистрофический буллезный эпидермолиз,
- порокератоз Мибелли,
- врожденная пойкилодермия.

Предраковое поражение кожи в отличие от предракового состояния характеризуется различными признаками происшедшей трансформации.

Предраковое поражение кожи возникает в результате канцерогенного действия УФ-В излучения, химических канцерогенов, ионизирующего излучения. Риск развития повышается при использовании ряда лекарственных препаратов, в состав которых входит мышьяк; цитостатиков, фотохимиотерапии. В развитии предрака важная роль отводится вирусам (ВПЧ-6, ВПЧ-3, ВПЧ-5, ВПЧ-16).

Развитию инвазивного рака предшествует период различной продолжительности, что зависит от генетических и иммунных особенностей организма, характера и интенсивности воздействия канцерогенных веществ.

Группа предраковых состояний кожи включает:

- гигантскую кондилому Бушке-Левенштейна
- папулез бовеноидный
- диспластическую форму верруциформной эпидермодисплазии Левандовского-Лютца,
- ксеродерму пигментную
- кератоз солнечный
- дерматит радиационный
- внутриэпидермальные раки:
 - болезнь Боуэна
 - эритроплазия Кейра
 - внемаммарная локализация болезни Педжета