КРАПИВНИЦА ПИГМЕНТНАЯ

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

КРАПИВНИЦА ПИГМЕНТНАЯ - разновидность мастоцитоза, ограниченного или системного, обусловленного пролиферацией лаброцитов в различных органах и тканях и их дегрануляцией с выделением БАВ.

Чаще всего поражается кожа, реже - внутренние органы.

Клинически пигментная крапивница обычно проявляется множественными мелкими, округлыми, красновато-бурыми пятнами или несколько возвышающимися желтовато-коричневыми папулами, симметрично расположенными на коже туловище, шеи, конечностей.

При потираний пятен и папул пальцем или шпателем они становятся отечными и более яркими (феномен Унны-Дарье), что объясняется освобождением гистамина из гранул лаброцитов. Большую диагностическую ценность имеет определение повышенного во много раз уровня гистамина, серотонина и 5-ОИУК в крови и моче больных.

Лечение пигментной крапивницы малоэффективно.

Особое внимание уделяется щадящему режиму для больных.

Назначают:

- задитен длительно, циклами,
- комбинации Н1- и Н2-блокаторов,
- стугерон;
- наружно -«Фенистил» гель.
- Применяют ПУВА-терапию.