

Поражения кожи при болезнях поджелудочной железы

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

Поражения кожи при болезнях поджелудочной железы (за исключением сахарного диабета - [диабетида](#)) не относятся к числу частых. Большинство из них неспецифичны и лишь синдром глюкоганомы имеет ценное диагностическое значение.

Приводим некоторые из них.

Кровоизлияния кожные нередко возникают спустя 1-2 дня после приступа острого панкреатита, сопровождающегося кровоизлияниями в области хвоста поджелудочной железы.

Ливедо сетчатое в виде синюшно-розовой пятнистой сети локализуется на коже живота и верхней части бедер при остром панкреатите.

Панникулит узловатый может быть кожным признаком острого или хронического панкреатита, а также рака поджелудочной железы.

Тромбофлебит мигрирующий в виде коротких болезненных воспалительных тяжей по ходу вен на шее, туловище, конечностях является частым спутником рака поджелудочной железы.

Синдром глюкоганомы проявляется в первую очередь эритемой некролитической мигрирующей. Уровень глюкогона в плазме повышен в несколько раз.

К внекожным симптомам заболеваний поджелудочной железы относят :

- анемию,
- диарею,
- общую слабость и недомогание,
- снижение массы тела,
- глоссит,
- психические нарушения.