

БАКТЕРИД ПУСТУЛЕЗНЫЙ ЭНДРЮСА

О.Л. Иванов, А.Н. Львов
«Справочник дерматолога»

БАКТЕРИД ПУСТУЛЕЗНЫЙ ЭНДРЮСА - вид пустулеза ладоней и подошв инфекционно-аллергического генеза. Характеризуется образованием мелких везикул и пустул на неизменной коже. Возникновению болезни способствуют очаги хронической инфекции. Развивается реакция гиперчувствительности к антигенам стрептококка.

Ряд авторов относят заболевание к [пустулезному псориазу](#), однако клинической и гистологической идентичности этих двух процессов нет.

Клиника Бактерида Эндрюса.

Заболевание проявляется высыпанием везикул и пустул в центральных зонах ладоней и подошв на неизменной коже. В результате роста везикулопустулезные элементы достигают 5-10 мм в диаметре, часть из них бывает окружена узким воспалительным венчиком. Постепенно процесс захватывает всю поверхность ладоней и подошв, включая боковые части, однако не переходит на пальцы. Беспокоят зуд, болезненность. Общее состояние не нарушается. Содержимое пустул стерильное. Процесс длится 2-3 нед., после чего наступает ремиссия.

Дифференциальный диагноз проводят с:

- [дисгидрозом](#),
- [дисгидротической экземой](#),
- [микозом стоп](#),
- [пустулезным псориазом](#).

Лечение Бактерида Эндрюса.

- десенсибилизирующие препараты,
- антигистаминные средства,
- аскорутин;

местно -

- противовоспалительные и редуцирующие пасты,
- кортикостероидные кремы, мази.